

BLE

Stade) Redressement : 5
(1 noeud : 6 (les plus avancés)

MALADIES

★ Situation

- * En Limousin : début évolution de la Septoriose (tritici) dans de nombreuses parcelles.
- * En Auvergne : le piétin-verse est présent dans de nombreuses parcelles de l'ALLIER (Sologne surtout), mais l'intensité des attaques est modérée.
Degré de pénétration : 2 - 3ème gaine.

★ Préconisation

- * En Limousin :

Il est trop tôt pour intervenir contre la Septoriose.

- * En Auvergne :

Dans l'ALLIER, la lutte contre le piétin-verse en situations de résistance aux benzimidazoles doit s'effectuer avec SPORTAK PF (ou PUNCH C) dès maintenant. (Piétin-verse sur les gaines externes).

Seuil d'intervention : 20 % des talles touchés.

ORGE D'HIVER

Stade) Redressement : 5
(1 noeud : 6

MALADIES

★ Situation

Limousin. La Rhynchosporiose commence à évoluer surtout en

★ Préconisation

Dans les parcelles les plus avancées, un traitement peut s'envisager dès maintenant si la maladie évolue sur la 3ème feuille en partant du sommet de la plante.

CONSERVER LE DEPLIANT JOINT ; IL Y SERA FAIT
SOUVENT REFERENCE

